

Travisto Activ, 30 tabletek



Cena: 15,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	(3,150-3,745 mg + 10 mg + 1 mg)/ tabletkę
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aloe extractum siccum, Fumariae herbae extractum siccum, Boldinum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- W zaburzeniach trawienia spowodowanych zaburzeniami wydzielania żółci (wzdęcia, uczucie pełności, odbijania), w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych,
- W celu regulacji częstości wypróżnień (w sporadycznych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

Działanie

Lek stosowany tradycyjnie, jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 18 lat:

- w zaburzeniach trawienia i lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych: 1 do 2 tabletek dziennie przed posiłkami nie częściej niż 4 razy dziennie.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.

- w sporadycznych zaparciach 3 do 5 tabletek raz dziennie przed snem. Wystarczające jest przyjęcie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.
- Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.
- Produktu leczniczego nie wolno stosować dłużej niż 7-10 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Skład

1 tabletkę zawiera 15 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Aloe ferox Miller (alona) odpowiadającego 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 10 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z

Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy) DER 4-6:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 1 mg Boldinum (boldyna).
Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na alone, ziele dymnicy, boldynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
- Niedrożność dróg żółciowych;
- Niewydolność wątroby, żółtaczkę;
- Ostre stany zapalne dróg żółciowych, nerek i jelit;
- Menstruacja, ciąża, okres karmienia piersią;
- Ból brzucha niewiadomego pochodzenia;
- Jeśli pacjent jest silnie odwodniony i ma niedobór elektrolitów;
- Dzieci i młodzież do 18 lat.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

- kurczowe bóle żołądkowo-jelitowe, melanoza okrężnicy (łagodne zaburzenia pigmentacji ściany okrężnicy rozpoznawane podczas kolonoskopii);
- reakcje nadwrażliwości;
- zaburzenie równowagi elektrolitowej;
- białkomocz, krwiomocz;
- żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH) zabarwienie moczu przez metabolity aloesu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.