


Tribiolac Elektrolity, smak pomarańczowy, 10 saszetek



Cena: 11,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP. K.
Rejestracja	
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis

Tribiolac Elektrolity, smak pomarańczowy, dla dzieci od 3 roku życia oraz dorosłych. Jest to doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności 209 mOsm/l stosowany w celu przywrócenia równowagi elektrolitowej w czasie biegunki, wymiotów oraz do zapobiegania odwodnieniu organizmu. Płyn uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz zapobiega odwodnieniu.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w celu przywrócenia równowagi elektrolitowej w czasie biegunki, wymiotów, odwodnienia organizmu dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych.

Zalecane spożycie

- 1 saszetkę rozpuścić w 200 ml ciepłej wody.
- Przed podaniem schłodzić. W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką). Zaleca się podawać porcjami przez pierwsze 3 - 4 godziny nawadniania:
- Dzieci do 20 kg m.c.-4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu).
- Dzieci powyżej 20 kg m.c. i dorośli – 5-6 saszetek (1000-1200 ml przygotowanego płynu).

W dalszych etapach nawadniania (faza nawadniania podtrzymującego), płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym wypróżnieniu lub wymiotach. W przypadku profilaktyki odwodnienia stosować jak w fazie nawadniania podtrzymującego.

Skład

- Składniki - 1 saszetka: glukoza 2,5 g, cytrynian sodu 0,6 g, chlorek sodu 0,4 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat pomarańczowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza.

Zawiera cukier i substancje słodzące.

- Wartości odżywcze w 200 ml płynu: wartość energetyczna 11,6 kcal, tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g, węglowodany, w tym glukoza 2,86g/2,5 g, błonnik 0g, białko 0g, sól 0,38g, sód 298mg, potas 160mg (8%)*, chlorki 388mg (49%)*, cytrynian 386mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
- W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
- Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.
- Zachować ostrożność w przypadku niewydolności serca.
- Przeciwwskazania do stosowania: wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, niewydolność nerek, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, podwyższone stężenie wapnia we krwi.

Dodatkowe informacje

- Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.
- Nie należy stosować preparatu jako jedyne źródło pożywienia.
- Preparat nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.