

Tribiotic (400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m.)/g, maść, 5 g



Cena: 13,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	5 g
Dawka	(5mg+5000j.m.+400j.m.)/g
Opakowanie	5 g
Postać	maść
Producent	KATO LABS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas, Bacitracinum zincum

Opis produktu

Wskazania

Zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

- Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
- Preparat należy stosować raz do trzech razy na dobę. Niewielką ilość preparatu nanieść na zmienione chorobowo miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu skóry. W razie konieczności można zastosować ochronny, jałowy opatrunek.
- Stosować nie dłużej niż 7 dni.
- Dzieci: nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

Skład

1 g maści zawiera 400 j.m./g bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas) i 5000 j.m./g polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas).
Substancje pomocnicze: Wazelina biała.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku:

- w nadwrażliwości na bacytracynę cynkową, neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego,
- na błony śluzowe,

- na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
- na głębokie lub klute rany, ciężkie oparzenia,
- do oczu,
- na sączące zmiany skórne.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte, w celu ochrony przed wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku należy przerwać jeśli nie ma poprawy, w razie pogorszenia objawów lub wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych, jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia.

W przypadku silnych odczynów alergicznych, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.

Pacjenci uczuleni na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów lub polimyksyn mogą być uczuleni na inne aminoglikozydy lub polimyksyny. W przypadku wystąpienia silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie.

Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i wystąpienie objawów neurotoksycznych.

Szczególnie ostrożnie należy stosować preparat u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu.

Ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest większe.

Preparat może nasilać działanie jednocześnie stosowanych preparatów o działaniu nefro- lub ototoksycznym.

Substancje czynne preparatu, a zwłaszcza neomycyna, mogą wywierać szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży lub rozwój płodu/novorodka.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie należy stosować leku w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.