

Tribux Bio 100 mg, 10 tabletek



Cena: 19,71 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Trimebutinum

Opis produktu

Opis

Tribux Bio, lek przeznaczony do krótkotrwałego leczenia. Zawiera trimebutynę w ilości 100 mg na tabletkę. Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego. Nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy.

Wskazania

- Zaburzenia trawienia objawiające się: uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha.
- Zaburzenia czynności układu pokarmowego wywołane stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha).

Działanie

Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Dawkowanie

- Stosować doustnie, przed posiłkiem. Nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem. Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
- Dorośli: 1 tabletkę 2 lub 3 razy na dobę przed posiłkiem.
- Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat: o zastosowaniu leku powinien zdecydować lekarz. Dawka dobową nie może przekraczać 6 mg na kilogram masy ciała dziecka.

Skład

Substancją czynną leku jest 100 mg trimebutyny maleinianu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, powidon, krospowidon i magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na trimebutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Ciąża.

Działania niepożądane

- Często (u 1 do 10 na 100 osób): senność, ospałość, uczucie zmęczenia, apatia, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie ciepła lub zimna, suchość w ustach, drętwienie ust, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia.
- Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób): wysypka.
- Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób): nierówne bicie serca, zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT i AspAT we krwi.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, w tym pojedyncze przypadki): niepokój, osłabienie słuchu, zapalenie wątroby, zmiany skórne (świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień), zatrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, bolesne powiększenie piersi u kobiet, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), ból piersi.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
- Lek może być stosowany przez kobiety karmiące piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.