

## Trilac, 20 kapsułek twardych



Cena: 24,63 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	20 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.
Rejestracja	Lek

### Opis produktu

#### Opis

Trilac, lek wydawany bez recepty w postaci kapsułek twardych. Korzystnie działa na przewód pokarmowy człowieka, ponieważ zawiera bakterie kwasu mlekowego, które obniżając pH w przewodzie pokarmowym umożliwiają rozwój prawidłowej flory jelitowej oraz zapobiegają osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.

#### Wskazania

- Poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym

rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

- Zapobieganie bieguncie podróżnych,
- Leczenie wspomagające po antybiotykoterapii.

#### Działanie

- *Lactobacillus acidophilus* kolonizuje i rozmnaża się w jelicie cienkim i grubym. Stwarza korzystne warunki do rozwoju *Bifidobacterium lactis*, bakterii, których ilość w przewodzie pokarmowym maleje u osób starszych.

– *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* nie należy do naturalnej, stałej flory jelitowej, ale jest ważny dla środowiska przewodu pokarmowego, ponieważ produkuje naturalne związki o właściwościach antybiotycznych.

#### Dawkowanie

1-2 kapsułki doustnie 3 razy na dobę przez 2 tygodnie do 1 miesiąca, następnie można stosować do 2 kapsułek na dobę. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

#### Skład

Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera  $1,6 \times 10^9$  CFU\* bakterii kwasu mlekowego:

- *Lactobacillus acidophilus* (La-5) 37,5%
- *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27) 25%
- *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) 37,5%

\*CFU-jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit)

**Substancje pomocnicze:**

Mleko w proszku odtłuszczone, wyciąg z drożdży, sodu askorbinian, magnezu stearynian, inozytol, sodu glutaminian, sodu alginian, glukoza bezwodna.

Ostonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek.

**Przeciwwskazania**

- Nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Nadwrażliwość (uczulenie) na białko mleka krowiego.

**Przechowywanie**

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze 2-8oC (w lodówce).
- W trakcie leczenia można przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.