

# Trilac Lady Gyno, 10 globulek dopochwowych



Cena: 29,88 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 globulek
Postać	globulki dopochwowe
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis produktu

Trilac lady gyno to wyrób medyczny w formie globulek z kwasem mlekowym. Po zastosowaniu globulek tworzą na błonie śluzowej powłokę, która chroni i nawilża nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami. Globulki tTrilac Lady zmniejsza dyskomfort związany z uczuciem napięcia, suchości, pieczenia i świądu. Globulki przywracają naturalne pH pochwy, przez co redukuje nieprzyjemny zapach i wspiera utrzymanie naturalnej flory bakteryjnej na prawidłowym poziomie. Trilac lady gyno poprawia elastyczność pochwy.

### Zastosowanie

Wyrób medyczny polecany dla kobiet w wieku rozrodczym i w okresie menopauzy.

W celu zmniejszenia dolegliwości związanych z:

- niedoborem estrogenów,
- atrofią błon śluzowych pochwy,
- bolesnością w trakcie stosunku,
- długotrwałym stresem,

W celu wspomaganie nawilżenia nabłonka pochwy:

- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych,
- w przypadku obtarć i niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy,
- po porodzie,
- po chemioterapii, krioterapii i radioterapii,
- po zabiegach laserowych,
- po zmianach zachodzących po stosowaniu leków hormonalnych,
- w okresie okołomenopauzalnym,
- w celu zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu,
- w celu wyrównania prawidłowego poziomu flory bakteryjnej i pH pochwy.

### Sposób użycia

- Stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 2-3 dni, aż do ustąpienia objawów.
- Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej.

### Składniki

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

### Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.
- W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.
- Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.
- Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.
- Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie) zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują samoistnie.

### Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.