

Ulgasim 240 mg, 30 kapsułek



Cena: 13,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	240 mg
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Simeticonum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Ulgasim, wyrób medyczny na wzdęcia, uczucie pełności, gazy, odbijanie oraz wskazane badania diagnostyczne. Ulgasim zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia ich pękanie, a następnie wydalanie.

Zastosowanie

- W celu łagodzenia uczucia pełności, wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach.
- Pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Zalecane spożycie

- Doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

- Dorośli: doraźnie 1 kapsułka, 2-3 razy dziennie. Maksymalnie 3 kapsułki dziennie (720 mg symetykonu).
- Dzieci powyżej 12 roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Skład

- Zawiera 240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej.
- Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol, dwutlenek tytanu (E171).
- Wyrób medyczny nie zawiera cukru.

Przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- Nie wolno stosować więcej niż 3 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia.
- Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania preparatu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Ulgasim i innych preparatów.