

# Ulgix Laxi 50 mg, 30 kapsułek miękkih



Cena: 14,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50 mg
Opakowanie	30 kapsułek miękkih
Postać	kapsułki miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Docusatum natriicum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Zapobieganie zaparciom i leczeniu przewlekłych zaparć, wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest wysiłek przy oddawaniu stolca oraz w przygotowaniu do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

### Działanie

Dokuzynian sodu działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Dzięki temu ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym, co zmienia konsystencję stolca i ułatwia wypróżnienie. Dokuzynian nie pobudza perystaltyki jelit.

### Dawkowanie

- Lek stosuje się doustnie.
- Dorośli: od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg)
- Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg)
- Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.
- Działanie leku występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

### Skład

Substancja czynna sodu dokuzynian.

Jedna kapsułka zawiera 50 mg sodu dokuzynianu.

Inne składniki leku to: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, żelatyna, sorbitol ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
- Nudności i wymioty,
- Zapalenie wyrostka robaczkowego,
- W przypadku wystąpienia niedrożności jelit oraz stanów zagrażających wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy),
- W razie ostrego bólu o nieznanym przyczynie w jamie brzusznej,
- Krwawienie z przewodu pokarmowego o nieznanym przyczynie,
- Stany odwodnienia organizmu.

#### **Działania niepożądane**

Działania niepożądane podczas stosowania dokuzynianu sodu w dawkach terapeutycznych występują rzadko i obejmują: dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku, bóle w nadbrzuszu, kolikowe bóle jelit, biegunkę; skórne reakcje uczuleniowe - wysypki.

#### **Przechowywanie**

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Lek jest zalecany dla dzieci powyżej 6 lat.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.