


Undofen Amorolfina 50 mg/ ml, lakier do paznokci leczniczy, 2,5 ml



Cena: 72,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 mg/ ml
Opakowanie	2,5 ml
Postać	lakier do paznokci, leczniczy
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Amorolfinum

Opis produktu

Opis

Produkt leczniczy Undofen Amorolfina to nowoczesny preparat na grzybicę paznokci. Ma postać wygodnego w użyciu lakieru do paznokci, do stosowania miejscowego, na zmienione chorobowo wskutek zakażenia grzybiczego paznokcia. Wystarczy 1 aplikacja w tygodniu. Produkt precyzyjnie dociera do źródła infekcji (nawet do głębszych warstw paznokcia) i dzięki temu leczy grzybicę paznokci. Dodatkowo wspiera regenerację odrastającej płytki.

Wskazania

- Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci.
- Leczenie grzybicy paznokci (łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej) u stóp lub dłoni wywołanej przez drożdżaki, dermatofity lub pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci.

Działanie

Produkt precyzyjnie dociera do źródła infekcji (nawet do głębszych warstw paznokcia) i dzięki temu leczy grzybicę paznokci. Dodatkowo wspiera regenerację odrastającej płytki.

Dawkowanie

- Przed pierwszą aplikacją leku należy dokładnie opłówać zakażony paznokieć, a następnie jego powierzchnię oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego do lakieru wacika nasączonego alkoholem.
- Lakier na grzybicę paznokcia należy nakładać szpatułką na całą powierzchnię paznokcia. Po aplikacji lakier pozostawiamy do wyschnięcia na około 5 minut. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić za pomocą tego samego wacika, którym została oczyszczona płytka paznokcia.
- Undofen Amorolfina nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może okazać się korzystna w niektórych przypadkach.

- Czas leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia zakażenia. Zwykle kuracja trwa 6 miesięcy w przypadku leczenia grzybicy paznokci rąk i około 9-12 miesięcy w przypadku leczenia grzybicy paznokci stóp. Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych.

Skład

1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodoru)

Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny

Przeciwwskazania

Nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą.
- Przechowywać butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować u dzieci.
- Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia.
- Nie połykać. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.