

Undofen Max Krem 10 mg/ g, krem przeciwgrzybiczy, 15 g



Cena: 27,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 mg/ g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Terbinafinum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Do stosowania u osób dorosłych w przypadku:

- Zakażenia grzybicze skóry: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
- Łupież pstry.

Działanie

Lek działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Dawkowanie

Dorośli:

- Lek można stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on наносzony. Następnie należy nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, i lekko wcierać. Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc.

Czas leczenia:

- Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni.
- Łupież pstry - 14 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie niezgodne z zaleceniami lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby

Skład

- Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

- Pozostałe składniki: izopropylu mirystynian, alkohol cetostearylowy, olbrot syntetyczny, sorbitanu stearynian, polisorbitat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- W miejscu podania mogą wystąpić objawy takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zmiana koloru skóry, uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości, w tym z wysypką, które wymagają przerwania leczenia.
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): łuszczenie skóry, swędzenie.
- Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, zaczerwienienie, uczucie pieczenia, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.
- W przypadku kontaktu leku z oczami, może wystąpić podrażnienie oczu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować leku u dzieci.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Undofen Max jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku do oczu, należy przemyć je czystą, ciepłą wodą.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry matki leczonej tym lekiem.

- Lek ten zawiera alkohol cetostearylowy i z tego względu może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.