


Undofen Max Spray 10 mg/ g, aerozol na skórę, 30 ml



Cena: 31,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	10 mg/ g
Opakowanie	30 ml
Postać	aerozol na skórę, roztwór
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Terbinafinum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Do stosowania przez osoby dorosłe.
- Zakażenia grzybicze skóry: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
- Łupież pstry.

Działanie

Przeciwgrzybicze do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek, który działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących schorzenia skóry u ludzi. Lek działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne.

Dawkowanie

- Lek jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę.
- Należy oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on наносzony; zdjąć kapturek ochronny; przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę nim pojawi się płyn;
- Lek może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej;
- Rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości;
- Założyć z powrotem kapturek ochronny;
- Po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dorośli:

- Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 1 raz na dobę przez 7 dni.

- Łupież pstry (Pityriasis versicolor) - 2 razy na dobę przez 7 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie niezgodne z zaleceniami lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Jeśli po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

- W celu zwiększenia efektu leczniczego należy zmienioną chorobowo skórę: utrzymywać w czystości przez regularne mycie. Wycierać delikatnie, nie trzeć. Unikać drapania się.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

Skład

- Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

1 g roztworu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodoru

- Pozostałe składniki: makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- W miejscu podania mogą wystąpić objawy takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zmiana koloru skóry, uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości, w tym z wysypką, które wymagają przerwania leczenia.
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): łuszczenie skóry, swędzenie.
- Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, zaczerwienienie, pieczenie, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby w miejscu podania
- W przypadku kontaktu tego leku z oczami może wystąpić podrażnienie oczu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.
- W oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy stosować ostrożnie w miejscach, które są wrażliwe na działanie alkoholu gdyż mogą być podrażnione przez zawarty w produkcie alkohol. Leku nie należy stosować na skórę twarzy.
- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku kontaktu leku z oczami, należy umyć je dokładnie bieżącą wodą.
- W razie przypadkowej inhalacji lekiem, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować leku u dzieci.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie są znane interakcje tego leku z innymi lekami.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować lek w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry matki leczonej tym lekiem.
- Lek zawiera: glikol propylenowy, dlatego może powodować podrażnienie skóry.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.