

# Unguentum Neomycini 5 mg/ g, maść, 5 g



Cena: 17,00 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	5 g
Dawka	5 mg/g
Opakowanie	5 g
Postać	maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Neomycinum

## Opis produktu

### Opis

Unguentum Neomycini to maść do stosowania na skórę. Lek ten zawiera antybiotyk neomycynę, należący do antybiotyków aminoglikozydowych. Lek stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyrączność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.

### Wskazania

Lek stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyrączność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.

### Działanie

Lek ten zawiera antybiotyk neomycynę, należący do antybiotyków aminoglikozydowych. Neomycyna działa bakteriobójczo na gronkowce i liczne bakterie Gram - ujemne, w tym na Escherichia coli, Haemophilus influenza i bakterie z rodzaju Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella i Shigella oraz na prątki kwasooporne, w tym także odporne na streptomycynę szczepy Mycobacterium tuberculosis. Neomycyna nie działa na bakterie Pseudomonas aeruginosa i bakterie z rodzaju Streptococcus oraz nie działa na grzyby, drożdżaki i wirusy.

### Dawkowanie

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni.
- Po użyciu leku należy umyć ręce.

## Skład

- Substancją czynną leku jest neomycyny siarczan.

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu.

- Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Okres ciąży i karmienia piersią;
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uszkodzenie słuchu;
- Stosowanie na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żyłakowe lub długotrwałe, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego słuch lub nerki;
- Jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na narząd słuchu, nerki lub układ nerwowy;
- Podeszły wiek;
- Zaburzenia czynności nerek;
- Zaburzenia słuchu lub równowagi.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny i podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny toksyczne oraz zmiany o charakterze wypryskowym.

## Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Unguentum Neomycini należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Nie należy stosować leku przez dłuższy czas, gdyż powoduje to narastanie oporności bakterii, a także może spowodować nadkażenie grzybicze.
- Lek stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może być ototoksyczny (uszkadzać słuch i narząd równowagi) i nefrotoksyczny (powodować uszkodzenie nerek).
- Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Lek Unguentum Neomycini a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W trakcie stosowania tego leku na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa neomycyny z paramycyną, kanamycyną, tobramycyną, amikacyną i izepamycyną. Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe neomycyny i innych antybiotyków aminoglikozydowych (np. paromomycyny) lub innych leków o możliwym działaniu toksycznym na nerki lub układ nerwowy (np. bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimiksyny B, kolistyny, wariomycyny) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie tego leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: maść ta nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.