

# Unguentum Undecylenicum (50 mg + 200 mg)/ g, maść, 30 g



Cena: 19,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	(50 mg + 200 mg)/ g
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Undecylinic acid, Zinci undecylenas

## Opis produktu

### Opis

Unguentum undecylenicum jest maścią przeznaczoną wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancje czynne kwas undecylenowy i cynku undecylenian.

### Wskazania

Lek stosuje się w miejscowym leczeniu:

- grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy;
- powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej;
- łupieżu pstrego.

Lek stosuje się zapobiegawczo i leczniczo.

### Działanie

Substancje czynne kwas undecylenowy i cynku undecylenian mają działanie grzybobójcze na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i Microsporum). Lek działa nie tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

### Dawkowanie

- Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką warstwą maści. Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3 tygodni.
- Po użyciu leku należy umyć ręce.

### Skład

- Substancjami czynnymi leku są kwas undecylenowy i cynku undecylenian.

1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego i 200 mg cynku undecylenianu.

- Pozostałe składniki to: wazelina biała, euceryna bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), etylu parahydroksybenzoesan (E 214).

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na kwas undecylenowy, cynku undecylenian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

Nie stosować:

- na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;
- na błony śluzowe;
- w okolicach oczu;
- na rozległe powierzchnie skóry;
- u dzieci w wieku do 11 lat.

### Działania niepożądane

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- Mogą wystąpić miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka.
- Lek może drażnić błony śluzowe.

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Z uwagi na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu (E 214) i metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), lek może powodować wystąpienie pokrzywki oraz reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego).

Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli.

W takim przypadku należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

- jeśli stosuje się lek u osób z chorobami nerek;
- jeśli stosuje się lek u osób w podeszłym wieku; u osób w podeszłym wieku należy stosować lek na niewielkie powierzchnie skóry.
- Inne leki i Unguentum undecylenicum: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Ciąża i karmienie piersią: w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Unguentum undecylenicum nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Stosowanie u kobiet w ciąży lub karmiących piersią – wyłącznie na zlecenie lekarza.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
- Unguentum undecylenicum zawiera etylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

