

# Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do jamy ustnej, 30 ml



Cena: 14,07 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aerozol do stosowania w jamie ustnej
Producent	ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

## Opis produktu

### Wskazania

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

### Działanie

Miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

### Dawkowanie

- Lek stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.
- Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
- Dzieci od 6 do 12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
- Stosowanie leku nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.

### Skład

- Substancją czynną leku jest benzydaminu chlorowodorek (1,5 mg na 1 ml leku).

Ponadto lek zawiera: glicerol, sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, aromat miętowy (Aromat „fresh peppermint” 506041T), wodę oczyszczoną.

### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

### Działania niepożądane

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej.
- Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty.
- Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości.
- Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy po krótkotrwałym stosowaniu leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Ciąża i karmienie piersią: stosowanie po konsultacji z lekarzem.
- Lek może powodować uczulenie, ponieważ zawiera metylu parahydroksybenzoesan. Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.