

## Urofort, płyn doustny, 100 g



Cena: 17,50 zł

### Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Opakowanie	100 g
Postać	płyn doustny
Producent	TADEUSZ POLAŃSKI PRZEDSIĘB.FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY"
Rejestracja	Lek
Wiek	od 18 roku życia

### Opis produktu

#### Wskazania

W leczeniu łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, objawiających się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, kiedy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza.

#### Działanie

Zwiększa ilość moczu i poprawia przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

#### Dawkowanie

- Podanie doustne.
- Dorośli: 8 ml 2 razy dziennie.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli podczas stosowania objawy utrzymują się dłużej niż 4 dni lub się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

#### Skład

1 ml płynu doustnego Urofort zawiera 1 ml wyciągu płynnego złożonego (1:1) z *Arctostaphylos uva-ursi* L. (liść mącznicy) / *Solidago virgaurea* L. (ziele nawłoci) / *Urtica dioica* L. (ziele pokrzywy) (45/35/20). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 50% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie 40-50% (V/V).

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub rośliny z rodziny astrowatych/złożonych.
- Stany chorobowe, w których zalecane jest przyjmowanie niewielkich ilości płynów.
- Obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca i nerek.

#### Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- W zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
- W okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.