

Urosal 300 mg + 300 mg, 20 tabletek



Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Dawka	300 mg + 300 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Methenaminum, Phenylum salicylicum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Zapalenie pęcherza moczowego.
- Zapalenie nerek.
- Stany zapalne pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.
- Zapalenie miedniczek nerkowych.
- Biegunka.
- Nieżyt jelit.

Działanie

Przeciwbakteryjne (działanie skojarzone metenaminy i salicylanu fenylu). Dodatkowo wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Lek do stosowania doustnego.
- Dorośli: 3 razy na dobę 1 tabletką. Przyjmować po jedzeniu, popijając wodą.

Skład

Substancjami czynnymi są: metenamina (Methenaminum), salicylan fenylu (Phenylis salicylas).

1 tabletką zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu.

Substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na salicylany i fenol.
- Niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczną znacznego stopnia, odwodnienie.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): zaburzenia układu pokarmowego.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): podrażnienie jelit i bóle brzucha, podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz.
- Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, skórne odczyny alergiczne, krwimocz.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera cukry – sacharozę i laktozę.
- W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.