

## Urosan Fix, zioła do zaparzania, 20 saszetek



Cena: 9,99 zł

### Opis słownikowy

Dawka	2 g
Opakowanie	20 saszetek
Postać	zioła do zaparzania w saszetkach
Producent	HERBAPOL-LUBLIN S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Mieszanka ziołowa
Wiek	od 12 roku życia

### Opis produktu

#### Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

- pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych,
- pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu.

#### Działanie

Moczopędne.

#### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu. Stosować przez okres 2-4 tygodni.
- Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

#### Skład

Betula Alba, Cichorium Intybus, Equisetum Arvense, Herniaria Glabra, Vitis Vinifera.

1 saszetka 2,0 g zawiera: ziele skrzypu 0,8 g; liść brzozy 0,7 g; korzeń podróżnika 0,3 g; liść borówki brusznicy 0,2 g.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na składniki roślin z rodziny Asteraceae (Compositae) lub pyłek brzozy.
- Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
- Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

**Działania niepożądane**

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Nie jest znana częstotliwość występowania. Ze względu na zawartość związków goryczowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością.

**Przechowywanie**

W temperaturze poniżej 25°C.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.
- W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.
- Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwiomocz, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek.
- Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.