

# Valdix Forte 355mg, 30 tabletek



Cena: 44,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	355 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valeriana officinalis
Wiek	od 12 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Valdix Forte jest lekiem o działaniu wyciszającym, uspokajającym; zawierający wyciąg suchy z korzenia kozłka w dawce 336 mg.

- Waleriana (kozłek lekarski)- skuteczny środek uspakajający w przypadku napięcia nerwowego. Zawarta w kozłku lekarskim waleriana działa relaksacyjnie, zmniejsza napięcie i uczucie niepokoju, odpręża i wzmacnia układ nerwowy. Korzystnie wpływa także na złagodzenie objawów stresu – zmniejsza częstotliwość skurczów serca (spowalnia akcję serca) oraz obniża ciśnienie.

### Wskazania

Stosowanie w celu łagodzenia stanów umiarkowanego napięcia nerwowego oraz w zaburzeniach snu.

### Działanie

Valdix Forte jest produktem leczniczym roślinnym o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie i poprawiającym jakość snu.

### Dawkowanie

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym:

- w stanach umiarkowanego napięcia nerwowego – 2 tabletki do 3 razy na dobę,
- w zaburzeniach snu – 2 tabletki pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo 2 tabletki wieczorem.

Maksymalna dawka dobową: 8 tabletek. Zalecany okres stosowania: 2-4 tygodnie. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się po 2 tygodniach stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

### Skład

Substancją czynną leku jest 355 mg wyciągu wodnoalkoholowego, suchego z korzenia kozłka (*Valeriana officinalis* L., radix) (3-4:1), ekstrahent: etanol 60 % (V/V).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102 i typ 12), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka

Opadry 03B90571 Blue (skład: tytanu dwutlenek (E 171), hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, pigment aluminiowy indygotyny).

**Przeciwwskazania**

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

**Działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Przechowywanie**

Lek należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.
- Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, dlatego nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny.