

Valerin 200 mg, lek uspakajający, 15 tabletek drażowanych

Cena: 11,69 zł



Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	15 tabletek drażowanych
Postać	tabletki drażowane
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valeriana
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Łagodne stany napięcia nerwowego i niepokoju,
- Trudności w zasypianiu.

Działanie

Uspakajające, ułatwiające zasypianie.

Dawkowanie

Dorośli, młodzież i osoby w podeszłym wieku:

- W łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju: 1-2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.
- W trudnościach z zasypianiem: 2-3 tabletki drażowane na 1/2 godz. przed planowanym snem.
- Zalecany czas leczenia to okres od 2 do 4 tygodni.
- Jeśli objawy nasili się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy stosować doustnie.

Skład

- Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae radix extractum siccum).
- Jedna tabletki drażowana zawiera 200 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L, radix (korzeń kozłka) (3-6:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, mannitol (E 421), magnezu stearynian, laurylosiarczan sodu, krzemionka koloidalna, sacharoza, talk, guma arabska, brąz HT (E 155), wosk Carnauba.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na wyciąg z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli pacjent źle toleruje przetwory zawierające korzeń kozłka (walerianę);
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W opakowaniu oryginalnym, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje syntetyczne leki uspokajające takie jak:

- barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu padaczki);
- leki nasenne z grupy benzodiazepin;
- leki nasenne.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syntetycznych leków uspokajających z tym lekiem ze względu na podobny mechanizm działania.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku.

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn przez okres do dwóch godzin po przyjęciu leku.

- Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.