

Valerin max, lek uspokajający, 10 tabletek powlekanych



Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	360 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valerianae radicis extractum siccum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

Działanie

Uspokajające.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę do 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.
- Lek należy stosować doustnie.
- Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do interwencyjnego leczenia ostrych stanów napięcia nerwowego. Aby uzyskać najlepszy efekt zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka, suchy (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum, 8-11:1) w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami (30 %).

Nośnikami są: maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%).

Ekstrahent: etanol 60% (v/v).

Pozostałe składniki to:

mannitol, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna (DCL 11), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT E155, Capol 1295 (wosk biały pszczeli i wosk carnauba).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na wyciąg z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje następujące leki: barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu padaczki); leki nasenne z grupy benzodiazepin; inne syntetyczne leki uspokajające. Nie zaleca się stosować ich jednocześnie z lekiem Valerin max ze względu na podobny mechanizm działania tych leków.
- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku.
- Nie zaleca się stosowania leku przez osoby kierujące pojazdami lub innymi maszynami.
- Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Działania niepożądane

Obserwowano przypadki nietolerancji korzenia waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha). Częstotliwość nie jest znana.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.