


Valused, (420 mg + 336 mg + 42 mg)/ml, płyn doustny, 90 g



Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | (0,42mg+0,336mg+0,042mg)/ml |
| Opakowanie | 90 g |
| Postać | płyn doustny |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Passiflorae tinctura, Humuli lupuli tinctura, Valerianae intractum |
| Wiek | od 12 roku życia |

Opis produktu

Wskazania

W okresowych stanach napięcia nerwowego (jako środek uspokajający) oraz w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym.

Działanie

Uspokajające, ułatwiające zasypianie.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: w okresowych stanach napięcia nerwowego 2 do 3 razy dziennie po 5 ml. Przy trudnościach w zasypianiu 10 ml leku jednorazowo na 1 godziny przed snem.
- Nie należy stosować leku dłużej niż 2 tygodnie.

Skład

100 g leku zawiera: substancje czynne: nalewka z ziela męczennicy (1:5; etanol 70% v/v) 45,0 g, nalewka z szyszek chmielu (1:5; etanol 80% v/v) 36,0 g, inkrakt z korzenia kozłka lekarskiego (1:1; etanol 96% v/v) 4,5 g.

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Lek zawiera 55-65% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
- Nietolerancja waleriany,
- Rzadko występująca dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Działania niepożądane

- Obserwowano zaburzenia żołądkowojelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany.
- W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, gdyż brak jest danych klinicznych w tej grupie pacjentów.
- Lek zawiera ok. 60% alkoholu, tzn. nie więcej niż 2,56 g etanolu w 5 ml, co odpowiada 65 ml piwa i 27 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Nie należy stosować leku z innymi lekami o działaniu uspokajającym ze względu na możliwość nasilenia działania leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.