

Valused Control, 30 kapsułek miękkih



Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kaps.miękkie
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Valused Control ze względu na swoje ziołowe składniki wspomaga dobre samopoczucie i pomaga radzić sobie ze stresem.

- Ashwagandha jest adaptogenem, który wspiera zwiększenie odporności organizmu na stres i pomaga sobie z nim radzić.
- Kozłek lekarski sprzyja uczuciu odprężenia i zrelaksowania przez co pomaga w sytuacjach stresowych. Oprócz tego kozłek lekarski wspiera naturalny i zdrowy sen.
- Męczennica cielistka wspomaga odporność organizmu na stres, działa wyciszająco i relaksująco oraz wspiera spokojny i zdrowy sen.
- Chmiel działa odprężająco oraz wspiera spokojny sen.

Zastosowanie

Valused Control jest polecany osobom:

- narażonym na stres,
- rozdrażnionym i przemęczonym,
- odczuwającym przebudżowanie.

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.

Skład	Składniki aktywne	Dzienna porcja 1 kapsułka
	wyciąg z korzenia ashwagandhy	143 mg
	stamdaryzowany na 7% witanolidów, w tym: witanolody	10 mg
	wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego	45 mg
	wyciąg z szyszek chmielu	20 mg
	wyciąg z męczennicy cielistej	20 mg

Składniki: olej sojowy, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca- glicerol, barwniki- tlenki i wodorotlenki żelaza), wyciąg suchy z korzenia ashwagandhy, wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego, wyciąg suchy z szyszek chmielu, wyciąg suchy z męczennicy cielistej, emulgator- lecytyna sojowa, substancja zagęszczająca- dwutlenek krzemu.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25⁰C. W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Po spożyciu produktu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produktu nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie należy stosować w przypadku przyjmowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym i przeciwpadaczkowym.