

Venożel, żel o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzętkowym, 100 g

Cena: 35,99 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	(0,012g+0,01g+5mg)/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum natricum, Tribenosidum, Escin



VENOŻEL (12 mg + 10 mg + 5 mg)/g, żel **Skład ilościowy i jakościowy:** 1 g żelu zawiera substancje czynne: diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum) 12 mg, trybenozydu (Tribenosidum) 10 mg i escynę (Escinum) 5 mg oraz substancje pomocnicze. **Postać farmaceutyczna:** Żel. **Wskazania do stosowania:** zapalenia żył kończyn dolnych; obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych; zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa; pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania); ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, D02APF3 Irlandia.

Ven-PL-2111-036

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Opis produktu

Opis

Lek w postaci żelu Venożel stosowany przy obrzękach, bólu i stanie zapalnym żył nóg. Żel o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzętkowym.

Wskazania

- zapalenia żył kończyn dolnych,
- pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania),
- obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,
- zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,
- ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

Składniki

1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5 mg escyny (Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wodę oczyszczoną.

Stosowanie

Venożel należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm.

Po nałożeniu rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Uszkodzenie, zmiany zapalne skóry, otwarte rany,

Ostatnie 3 miesiące ciąży oraz okres karmienia piersią,

Występowanie napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

W temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny / Wytwórca: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

VENOZEL®
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe

PRZECIWBÓLOWE

PRZECIWPALNE

PRZECIWOBRZĘKOWE

3 POTRÓJNE DZIAŁANIE:

VENOZEL 100 g i 50 g to żele o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Działanie przeciwbólowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwzapalne jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwobrzękowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak działa VENOZEL ?

- łagodzi obrzęki, w tym obrzęki zastoinowe kończyn dolnych oraz powstające po operacjach i urazach
- łagodzi ból i stan zapalny żył kończyn dolnych
- uszczelnia naczynia krwionośne

VENOZEL
Lek OTC

VENOZEL 100 g i 50 g to żele o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Działanie przeciwbólowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwzapalne jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwobrzękowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Komu poleca się VENOZEL ?

- osobom, którym dokuczają bóle nóg i obrzęki (także obrzęki poporaczynne, pourazowe czy zastoinowe nogi)
- osobom z zapaleniem żył kończyn dolnych
- osobom narzekającym na ból i obrzęki ze względu na pracę stojącą*

* Osoby z zapaleniem żył kończyn dolnych.

VENOZEL 100 g i 50 g to żele o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Działanie przeciwbólowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwzapalne jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwobrzękowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VENOZEL® SILNE uderzenie w ból i obrzęki nóg

VENOZEL®
100 g i 50 g

dostępne wielkości opakowań 50 g i 100 g

VENOZEL 100 g i 50 g to żele o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Działanie przeciwbólowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwzapalne jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu. Działanie przeciwobrzękowe jest związane z obecnością w składzie leku substancji czynnych: ketoprofenu i ibuprofenu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.