

Venożel, żel o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzętkowym, 50 g

Cena: 20,68 zł



Opis słownikowy

Dawka	(0,012g+0,01g+5mg)/g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum natricum, Tribenosidum, Escinum



VENOŻEL (12 mg + 10 mg + 5 mg)/g, żel Skład ilościowy i jakościowy: 1 g żelu zawiera substancje czynne: diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum) 12 mg, trybenozydu (Tribenosidum) 10 mg i escynę (Escinum) 5 mg oraz substancje pomocnicze. **Postać farmaceutyczna:** Żel. **Wskazania do stosowania:** zapalenie żył kończyn dolnych; obrzęki pooperacyjne i pourazowe; obrzęki zastoinowe kończyn dolnych; zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa; pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania); ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Clonewest Business Campus Dublin 24, D04APF3 Irlandia.

Ven-PL-2111-069

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Opis produktu

Opis

Lek w postaci żelu Venożel stosowany przy obrzękach, bólu i stanie zapalnym żył nóg. Żel o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzętkowym.

Wskazania

- zapalenia żył kończyn dolnych,
- pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania),
- obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,
- zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,
- ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

Składniki

1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5 mg escyny (Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wodę oczyszczoną.

Stosowanie

Venożel należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm.

Po nałożeniu rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Uszkodzenie, zmiany zapalne skóry, otwarte rany,

Ostatnie 3 miesiące ciąży oraz okres karmienia piersią,

Występowanie napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

W temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny / Wytwórca: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

