

# Verbascon Gardło Med, smak pomarańczowo-grejpfrutowy, 24 pastylki do ssania



Cena: 13,19 zł

## Opis słownikowy

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Opakowanie  | 24 pastylki do ssania    |
| Postać      | pastylki do ssania       |
| Producent   | POLSKI LEK               |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Wiek        | od 6 roku życia          |

## Opis produktu

### Opis

Verbascon Gardło Med, smak pomarańczowo-grejpfrutowy, pastylki do ssania na gardło. Zawierają składniki powlekające błony śluzowe jamy ustnej tworząc na ich powierzchni barierę o właściwościach nawilżających i antyseptycznych. Olejki eteryczne i mentol ułatwiają oddychanie.

### Zastosowanie

- W stanach zapalnych jamy ustnej i gardła
- Przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, przeziębieniach którym towarzyszy ból gardła, suchość w jamie ustnej bądź chrypka.
- Wyrób może być używany przez osoby pracujące głosem, osoby narażone na długotrwałe przebywanie w suchych pomieszczeniach lub innych niesprzyjających warunkach klimatycznych (zapylenie, zadymienie, ogrzewanie).

### Zalecane spożycie

- Dzieci powyżej 6 roku życia oraz osoby dorosłe.
- Ssać powoli 1 pastylkę w zależności od potrzeb 3–5 razy dziennie.

### Skład

Gęsty ekstrakt z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L.) DER 3-4:1, ekstrakt z propolisu; mentol, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy.

Pozostałe składniki: substancja słodząca: izomalt, aromat grejpfruta czerwonego, olejek z pomarańczy brazylijskiej, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe, sukraloza.

1 pastylka zawiera: ekstrakt z propolisu 33 mg, ekstrakt z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L.) DER 3-4:1 35 mg, olejek miętowy (*Mentha arvensis* L.) 2,5 mg, olejek eukaliptusowy (*Eucalyptus Globulus* Labill.) 3 mg, mentol 3,5 mg.

### Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25oC, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik.
- W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów po tygodniu należy zasięgnąć porady lekarza.
- Kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia ze względu na ryzyko zadławienia.