

Viagra Connect Max 50 mg, 4 tabletki powlekane



Cena: 77,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 mg
Opakowanie	4 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	UPJOHN EESV
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum

Opis produktu

Opis

Viagra Connect Max jest lekiem zawierającym w swoim składzie sildenafil w dawce 50 mg. Wpływa na rozszerzanie naczyń krwionośnych w penisie, dzięki czemu zwiększa dopływ krwi.

Wskazania

Dla mężczyzn w wieku powyżej 18 roku życia, którzy mają trudności z osiągnięciem i (lub) utrzymaniem erekcji wystarczającej dla podejmowania aktywności seksualnej.

Działanie

Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie

- 1 tabletkę około godziny przed planowaną aktywnością seksualną.
- Tabletkę połączyć w całości, popić wodą.
- Nie przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.
- Lek zaczyna działać w ciągu 30-60 minut.
- Lek można przyjmować do 4 godzin przed planowaną aktywnością seksualną.

Skład

Każda tabletkę zawiera 50mg sildenafilu (w postaci cytrynianu) oraz substancje pomocnicze – rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroscarmeloza sodowa i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna i indygotyna (E132).

Przeciwwskazania

- Nie przyjmować jeśli pacjent nie ma problemów z erekcją.
- Przyjmowanie przez pacjenta leków z grupy azotanów z powodu bólu w klatce piersiowej lub niewydolności serca.
- Jeśli pacjent przyjmuje riociguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylanową) z powodu podwyższonego ciśnienia krwi w

płucach.

- Jeśli pacjent przyjmuje rytonawir w leczeniu zakażenia HIV.
- Jeśli lekarza polecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi.
- Ciężka choroba serca, odczucie bólu lub dyskomfortu w klatce piersiowej (dławica piersiowa),
- Ciężka choroba wątroby.
- Niskie ciśnienie tętnicze.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka utrata wzroku lub jeśli stwierdzono u pacjenta pewną wrodzoną chorobę oczu.
- Jeśli penis pacjenta jest zniekształcony.
- Uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.