

## Vicks VapoRub, maść, 50 g



Cena: 24,99 zł

### Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 g
Opakowanie	50 g
Postać	maść
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Rejestracja	Lek

### Opis produktu

#### Wskazania

W objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa").

#### Działanie

Składniki czynne: kamfora, olejek eukaliptusowy, levomentol, olejek terpentynowy, łagodzą dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze. Mentol i kamfora łagodzą obrzęk śluzówek małżowin nosowych oraz łagodzą kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające. Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy działają pobudzająco na wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych, pobudzając odkrztuszanie.

#### Dawkowanie

- Miejscowo, do użytku zewnętrznego.
- Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji składników lotnych. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane miejsca i powtarzać 2 do 3 razy dziennie, jeśli potrzeba. Lekkie ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji parujących składników lotnych.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 łyżeczkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy dziennie.
- Dzieci od 5 do 12 roku życia: 1/2 łyżeczki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy dziennie.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: wcierać maść dokładnie w skórę klatki piersiowej i pleców; przykryć całą powierzchnię ciepłą tkaniną, dla lepszego efektu (nie stosować tworzyw utrudniających parowanie); używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.
- Dzieci od 5 do 12 roku życia: nakładać maść delikatnie na klatkę piersiową i plecy; wcierać delikatnie; używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.

#### Skład

Substancjami czynnymi leku są Levomentol, Kamfora, Olejek eukaliptusowy i Olejek terpentynowy.  
100 g Vicks VapoRub zawiera 2,75 g mentolu, 5 g kamfory, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego.

Inne składniki leku to: tymol, olejek cedrowy, wazelina biała.

#### Przeciwwskazania

- Stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
- Uszkodzona skóra, skaleczenia, nie stosować na błony śluzowe;
- Jeśli pacjent cierpi na czynną astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzono u niego nadwrażliwość dróg oddechowych;
- Dzieci poniżej 5 roku życia.
- Nie połykać.

#### Działania niepożądane

- Rzadko mogą występować łagodne podrażnienia lub reakcje alergiczne. W takim przypadku należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem jeśli reakcje nie miną wraz z przerwaniem stosowania maści.
- Możliwe reakcje w miejscu podania: zaczerwienienia, podrażnienia skóry i oczu przez parujące składniki lotne, alergiczne zapalenie skóry, reakcje miejscowe spowodowane nadwrażliwością na jeden ze składników leku.

Należy wówczas niezwłocznie usunąć ze skóry pozostałość maści ręcznikiem papierowym i zwrócić się do lekarza.

- W przypadku wystąpienia innych poważnych działań niepożądanych jak skurcz krtani lub drgawki należy natychmiast usunąć maść ze środowiska i wezwać lekarza.
- Po przypadkowym spożyciu znaczącej ilości maści obserwowano ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, bólu brzucha, bólu i zawrotów głowy, uderzeń gorąca, drgawek a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z ciężkimi objawami zatrucia ze strony układu pokarmowego lub z objawami neurologicznymi powinni być poddani obserwacji oraz leczeniu objawowemu, jeśli będzie taka potrzeba. Nie należy wywoływać wymiotów.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować szczególną ostrożność stosując lek jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na perfumy i rozpuszczalniki; jeśli pacjent cierpi na epilepsję lub występują drgawki; jeśli pacjent cierpi na astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz ma stwierdzoną nadwrażliwość dróg oddechowych.
- Nie stosować maści na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe.
- Chronić oczy.
- Nie stosować na klatkę piersiową w czasie karmienia piersią.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
- Jeśli maść zostanie przypadkowo połknięta przez dziecko, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, w celu zapewnienia właściwego leczenia. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli objawy nie miną lub pojawi się gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.