

Vitamina C Synteza, 500 mg, 10 kapsułek twardych



Cena: 4,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 500 mg |
| Opakowanie | 10 kapsułek twardych |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Acidum ascorbicum |
| Wiek | od 12 roku życia |

Opis produktu

Wskazania

Uzupełnienie niedoboru witaminy C w organizmie, leczenie metabolicznych następstw hipowitaminozy, leczenie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza, przyspieszenie procesu gojenia i bliznowacenia ran, pomocniczo w stanach obniżonej odporności organizmu, w przebiegu chorób infekcyjnych i okres rekonwalescencji.

Działanie

Witamina C uczestniczy w procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach organizmu. Bierze udział w biosyntezie kolagenu, czynnika warunkującego właściwy rozwój tkanki chrzęstnej, kości, zębiny, prawidłowym przebiegu procesu gojenia się ran i utrzymania prawidłowego stanu naczyń krwionośnych. Pobudza biosyntezę wielu substancji przestrzeni międzykomórkowych oraz syntezę prostacykliny. Hamuje wytwarzanie tromboksanu. Uczestniczy w procesie wchłaniania jonów żelaza z przewodu pokarmowego, metabolizmie tyrozyny, fenyloalaniny, kwasu foliowego, histaminy, noradrenaliny, karnityny, białek i lipidów oraz w przemianie steroidów nadnerczowych i cholesterolu. Hamuje utlenianie lipidów i unieczynnia wolne rodniki ponadtlenkowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie, 1 kapsułka raz lub dwa razy na dobę.

Skład

- Substancja czynna: kwas askorbowy.

1 kapsułka zawiera 500 mg witaminy C.

- Pozostałe składniki: żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, tytanu dwutlenek, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa.

Przeciwwskazania

Uczulenie na witaminę C lub którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: zaburzenia układu pokarmowego: biegunka, zgaga. Zaburzenia układu moczowego: zwiększone ryzyko powstawania kamieni moczanowych, cystynowych i szczawianowych.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
- Kobiety w ciąży i okresie laktacji - stosowanie leku po konsultacji z lekarzem.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, oraz o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Nie należy przyjmować u pacjentów w czasie radio- i (lub) chemioterapii.
- Lek zawiera barwniki, które u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.