

Vitaminum E Hasco 300 mg/ml, krople doustne, roztwór, 10 ml



Cena: 10,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	300 j.m./ ml
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.doustne
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tocopherolum
Wiek	od 1 dnia życia

Opis produktu

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem oraz zaburzeniami przemiany materii (np. dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu lipidów: abetalipoproteinemią, zespołem złego wchłaniania, mukowiscydozą).
- Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Działanie

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, jednak jej rola nadal nie jest dokładnie poznana. Razem z katalazą, dysmutazą nadtlenkową, peroksydazą glutationową oraz selenem wchodzi w skład systemu zabezpieczającego komórkę przed działaniem wolnych rodników tlenowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe w błonach i innych strukturach komórki, stabilizuje błony komórek i organelli komórkowych, zapobiega hemolizie czerwonych krwinek.

Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych. Bierze udział w utlenianiu glukozy i glikogenolizie. Uczestniczy w przemianach lipidów: prostaglandyn i cholesterolu. Witamina E obniża aktywność agregacyjną płytek krwi.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej zwykle stosuje się:

Zapobiegawczo: noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 6 lat: 10 mg (1 kropla) na dobę; dzieci od 7 do 15 lat: 20 mg (2 krople) na dobę; młodzież i dorośli: 30 mg (3 krople) na dobę.

Leczniczco:

- mukowiscydoza

- noworodki i niemowlęta (do 1 roku życia): 50 mg (5 kropli) na dobę;
- dzieci powyżej 1 roku życia: 100 mg (10 kropli) na dobę;
- młodzież i dorośli: 100 do 200 mg (10 do 20 kropli) na dobę;
- abetalipoproteinemia
- dzieci i dorośli: 50 do 100 mg/kg m.c (5 do 10 kropli/kg m.c) na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek nierozcieńczony lub wymieszany z napojem.

Skład

- Substancją czynną leku jest witamina E.
- 1 ml leku (około 30 kropli) zawiera 300 mg all-rac- α -tokoferylu octanu (witaminy E).
- 1 kropla leku zawiera ok. 10 mg all-rac- α -tokoferylu octanu (witaminy E).
- Pozostała substancja pomocnicza: olej arachidowy oczyszczony.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną (witaminę E) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Niedobór witaminy K.

Działania niepożądane

U osób dorosłych, po długotrwałym stosowaniu dawek wielokrotnie przewyższających zalecane, może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe (np. dikumarol, warfaryna) lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Lek można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie z przepisu lekarza.
- Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować tego leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.