

Vratizolin 30 mg/ g, krem, 3 g



Cena: 34,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	30 mg/g
Opakowanie	3 g
Postać	krem
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Denotivirum

LECZENIE OPRYSZCZKI WARG I TWARZY



Vra-PL-2312-234

Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/g, Krem. Skład ilościowy i jakościowy: 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru (Denotivirum). Postać farmaceutyczna: krem. Wskazania do stosowania: Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24FPT3, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Opis produktu

Opis

Krem Vratizolin stosowany w leczeniu opryszczki warg i twarzy. Zawiera lek przeciwwirusowy, denotywir, do stosowania miejscowego. Skraca czas trwania choroby i zastosowany na wczesnym etapie (okresie prodromalnym) może zapobiec jej rozwojowi (nie zapobiega nawrotom opryszczki).

Składniki

1 g kremu na opryszczkę Vratizolin zawiera 30 mg denotywiru (Denotivirum).

Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan i woda oczyszczona.

Stosowanie

Stosować miejscowo na skórę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu kremu należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia zakażenia na inne partie skóry.

Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się jej pierwszych objawów, np.: swędzenia i pieczenia.

Na zmienioną chorobowo skórę należy nałożyć niewielką ilość kremu kilka razy na dobę. Leczenie trwa zwykle około 5 dni.

U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby - wówczas jest konieczne natychmiastowe zastosowanie produktu leczniczego Vratizolin w celu zapobieżenia tworzenia się pęcherzyków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwości na denotywir lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności leku: 2 lata.

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

Leczenie opryszczki warg i twarzy

DO STOSOWANIA MIJSCOWO NA SKÓRĘ*

SKRACA CZAS TRWANIA CHOROBY**




*Zastosowanie w miejscach zmienionych chorobowo. **Zastosowanie w wczesnym stadium choroby. **Nazwa produktu leczniczego:** Vratizolin, 30 mg/g krem. **Skład substancji (aktywny):** 1 g kremu zawiera 30 mg denwirosofu. **Składniki:** Płynnik farmaceutyczny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Biocach Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, D24PFT5, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Vratizolin stosuje się w leczeniu opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Zawiera substancję przeciwwirusową – denwirotyl, który w postaci kremu przenika do chorobowo zmienionych warstw skóry.

- **Lek przeciwwirusowy bez recepty** do stosowania miejscowo na skórę.
- **Skraca czas trwania choroby.**
- Zastosowany w wczesnym etapie (okresie prodromalnym) **może zapobiec rozwojowi opryszczki** (nie zapobiega nawrotom opryszczki).



Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/g krem. **Skład substancji (aktywny):** 1 g kremu zawiera 30 mg denwirosofu. **Składniki:** Płynnik farmaceutyczny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Biocach Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, D24PFT5, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować lek Vratizolin

- Do stosowania miejscowego na zmienioną chorobowo skórę.
- Przed zastosowaniem i po zastosowaniu kremu **należy umyć ręce**, aby nie dopuścić do przeniesienia zakażenia na inne partie skóry.
- Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się jej pierwszych objawów, np.: swędzenia i pieczenia.



Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/g krem. **Skład substancji (aktywny):** 1 g kremu zawiera 30 mg denwirosofu. **Składniki:** Płynnik farmaceutyczny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Biocach Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, D24PFT5, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować lek Vratizolin

- Na zmienioną chorobowo skórę należy nałożyć **niewielką ilość kremu** kilka razy na dobę. Leczenie trwa zwykle **około 5 dni**.
- U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby – wówczas jest konieczne **natychmiastowe zastosowanie leku Vratizolin** w celu zapobieżenia tworzenia się pęcherzyków.



Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/g krem. **Skład substancji (aktywny):** 1 g kremu zawiera 30 mg denwirosofu. **Składniki:** Płynnik farmaceutyczny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Biocach Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, D24PFT5, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dla kogo lek Vratizolin

- Dla osób u których pojawiły się **pierwsze objawy opryszczki**, np.: swędzenia i pieczenia.



Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/g krem. **Skład substancji (aktywny):** 1 g kremu zawiera 30 mg denwirosofu. **Składniki:** Płynnik farmaceutyczny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Biocach Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, D24PFT5, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.