

Xenna 30 mg, zioła przeciw zaparciom, 40 saszetek

Cena: 17,90 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	40 saszetek
Postać	zioła do zaparzania w saszetkach
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sennae folium
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Xenna, zioła przeciw zaparciom, lek przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Zioła działają przeczyszczająco ale niegwałtownie, działanie odczuwalne jest po 8-10 godzinach od podania.

Wskazania

W doraźnym leczeniu zaparcć u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

- Saszetkę z ziołami zalać 200 ml wrzątku i pozostawić do zaparzania na 10 min.
- Zaleca się picie pół szklanki do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem.
- Efekt działania leku następuje po 8-10 godzinach od podania.

Skład

Sennae folium 0,9-1,1 g, co odpowiada 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną.
- Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej.
- Stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów.
- Zwężenie i niedrożność jelit, atonia jelit, ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

- Zaburzenia układu immunologicznego: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka).
- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): przewlekłe przyjmowanie lub nadużywanie może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Biegunka może powodować hipokaliemię, która może być przyczyną zaburzeń pracy serca, astenii mięśni, w szczególności podczas równoczesnego przyjmowania glikozydów nasercowych, leków moczopędnych, adrenokortykosteroidów lub korzenia lukrecji.
- Zaburzenia żołądka i jelit: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle brzucha, skurcze i wydalanie płynnych stolców w szczególności u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Objawy te mogą jednak występować również generalnie jako konsekwencja indywidualnego przedawkowania. W takich przypadkach niezbędne jest zmniejszenie dawki. Przewlekłe stosowanie może powodować przebarwienie błony śluzowej okrężnicy (pseudomelanosis coli), które zwykle ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podczas stosowania może wystąpić nieistotnie klinicznie żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH) przebarwienie moczu wywołane obecnością metabolitów leku. Przewlekłe stosowanie może powodować albuminurię i hematurię.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- W zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie ciąży i laktacji.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.