

Xenna Balance, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 6 saszetek

Cena: 17,95 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|--|
| Opakowanie | 6 saszetek |
| Postać | proszek do sporządzania roztworu doustnego |
| Producent | USP ZDROWIE SP. Z O.O |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Wiek | od 12 roku życia |

Opis produktu

Opis

Xenna Balance, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, wyrób medyczny przeznaczony jest do leczenia przewlekłych zaparć u osób od 12 roku życia. Substancją aktywną preparatu jest makrogol 3350, który zmiękcza stolec, pobudza naturalne ruchy jelit i ułatwia wypróżnianie. Preparat ma działanie miejscowe w obrębie jelita i nie jest wchłaniany do krwiobiegu.

Zastosowanie

Leczenie przewlekłych zaparć u osób od 12 roku życia.

Zalecane spożycie

Zawartość saszetki wsypać do szklanki z 125 ml wody (pół szklanki). Całość należy dobrze wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku, a następnie wypić.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, przyjmowanie preparatu należy rozpocząć od 1 saszetki dziennie, przyjmowanej rano.

Skład

Substancje czynne: 1 saszetka zawiera: makrogol (PEG) 3350 13,125 g, chlorek sodu 0,3507 g, sodu wodorowęglan 0,1785 g, chlorek potasu 0,0466 g

Pozostałe składniki: aromat pomarańczowy (zawiera substancje aromatyzujące, maltodekstrynę, gumę akacjową i alfa-tokoferol), aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera substancje aromatyzujące i ekstrakty zapachowe, maltodekstrynę, mannitol, glukonolakton, sorbitol, gumę akacjową i krzemionkę koloidalną bezwodną), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W ciąży i w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem.
- Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Nie należy stosować Xenny Balance: w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na makrogol 3350, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu lub którykolwiek

z pozostałych składników; jeśli doszło do perforacji jelita; w przypadku niedrożności jelit; jeśli występuje ciężka postać nieswoistego zapalenia jelit, czyli choroba taka jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna lub ostre rozdęcie okrężnicy; w przypadku nietolerancji wybranych, pewnych cukrów.