

Xylo-Pantenol Kids, aerozol do nosa (500mcg+50mg)/ml, 10 ml



Cena: 15,75 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	10 ml
Dawka	(500mcg+50mg)/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	TEVA B.V.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolinum, Acidum panthotenicum
Wiek	od 2 roku życia

Opis produktu

Opis

Xylo-Pantenol Kids jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne ksylometazolinę chlorowodorek i deksopantenol. wykorzystywany jest do leczenia zapalenia błon śluzowych nosa, ale również w leczeniu napadowego wysięku z nosa. Ksylometazolina obkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając obrzęk błony śluzowej nosa, Dekspantenol wspomaga gojenie się ran i działa ochronnie na błony śluzowe.

Lek Xylo-Pantenol Kids jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Wskazania

Leczenie objawowego wysięku z nosa i zapalenia błon śluzowych.

Dawkowanie

- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dzieci w wieku od 2 do 6 lat po jednym rozpyleniu leku Xylo-Pantenol Kids do każdego otworu nosowego, w razie potrzeby, ale maksymalnie do trzech razy na dobę.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: ksylometazolinę chlorowodorek + deksopantenol. Jedno rozpylenie aerozolu (0,1 mL roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazolinę chlorowodoreku i 5,0 mg deksopantenolu. 1 mL roztworu zawiera: ksylometazolinę chlorowodorek 0,5 mg i deksopantenol 50 mg.

Pozostałe składniki leku to: Potasu diwodorofosforan, Disodu wodorofosforan siedmiowodny, Woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- Jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (postać przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, który powoduje suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów),
- Jeśli pacjent przeszedł ostatnio zabieg neurochirurgiczny (przezskłnowe wycięcie przysadki lub inny zabieg chirurgiczny odsłaniający oponę twardą mózgu),
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

- Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: reakcje alergiczne (nadwrażliwości) - obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd

- Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: pobudzenie, bezsenność, omamy (szczególnie u dzieci)

- Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: zmęczenie (senność, uspokojenie polekowe), ból głowy, drgawki (szczególnie u dzieci)

- Zaburzenia serca:

Rzadko: kołatanie serca (palpitacje), przyspieszona czynność pracy serca (tachykardia)

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (arytmia)

- Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: po ustaniu działania leku zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa, krwawienia z nosa

Częstość nieznana: uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ciągłe stosowanie leku Xylo-Pantenol Kids może prowadzić do przewlekłego obrzęku i ostatecznie może spowodować zanik błony śluzowej nosa.
- Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (z jaskrą, szczególnie z jaskrą z wąskim kątem przesączania) powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.