

Xylodex Regeneracja, spray do nosa 1 mg/50 mg, 10 ml



Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	(0,1mg+5mg)/daw.
Opakowanie	10 ml
Postać	aerol do nosa, roztwór
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum, Dexpanthenolum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

W objawowym leczeniu niedrożności nosa podczas przeziębienia (kataru); po przebytej operacji nosa w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Działanie

Zmniejsza obrzęk błony śluzowej i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Lek przyspiesza gojenie się ran i bierze udział w procesie regeneracji błony śluzowej nosa. Lek udrożnia nos i wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin). Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę (łącznie maksymalnie 6 dawek w ciągu doby).

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: ksylometazolini chlorowodorek oraz deksopantenol.

Każda dawka aerolu do nosa zawiera 0,1 mg ksylometazolini chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

- Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny; potasu diwodorofosforan; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na ksylometazolini chlorowodorek, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku;

- Dzieci w wieku poniżej 6 lat;
- Jeśli pacjent przeżył ostatnio operację neurochirurgiczną (mózgu) lub operację przeprowadzoną przez nos (np. usunięcie przysadki mózgowej);
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd).
- Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): kołatanie serca; przyspieszenie akcji serca; podwyższenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie).
- Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000): pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, omamy (szczególnie

u dzieci); zaburzenia rytmu serca (arytmie serca); zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku, krwawienie z nosa; drgawki (szczególnie u dzieci).

- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 12 tygodni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.