

Xylogel 0,05%, żel do nosa 0,5 mg/g, 10 g



Cena: 22,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/g
Opakowanie	10 g (15 ml)
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Stosuje się miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:

- ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;
- ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych;
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
- ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Działanie

Lek zastosowany na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza ilość wydzieliny, tj. łagodzi katar. Dodatkowo lek nawilża błonę śluzową nosa oraz nie ścieka na dno jamy nosa i do gardła. Przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazolini chlorowodorek. Każdy gram żelu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazolini chlorowodoru.
- Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sorbitol, hydroksyetyloceluloza, glicerol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na ksylometazolini chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- U pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
- W przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działania niepożądane

- Miejscowe działania niepożądane: może wystąpić suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie.
- Bardzo rzadko występują objawy działania ogólnoustrojowego: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy) oraz kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).
- Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Przechowywanie

- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 12 tygodni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.