

Xylometazolin WZF 0,1%, krople do nosa, 1 mg/ml, 10 ml



Cena: 7,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do nosa, roztwór
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywołane przez wirusy lub bakterie,
- Ostre lub przewlekłe zaostrzające się zapalenie zatok przynosowych,
- Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
- Ostre zapalenie ucha środkowego (aby udrożnić trąbkę słuchową znajdującą się w uchu).

Działanie

Lek zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu zmniejsza uczucie zatkanego nosa i zatok.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 do 3 kropli do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda kropla zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; sodu chlorek; sorbitol; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjentowi usunięto przysadkę mózgową lub przebył on inną operację układu nerwowego.

- Jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa.

Działania niepożądane

- Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, duszność, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Reakcje takie występują bardzo rzadko.
- Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000): nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).
- Mogą wystąpić: podrażnienie i suchość w nosie, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie.
- Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 12 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować leku podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO.
- Nie należy stosować leku w czasie ciąży.
- Lek zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli podczas stosowania leku wystąpią takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, lek należy odstawić. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których wcześniej, po zastosowaniu innych podobnie działających leków pojawiły się takie objawy.
- Pacjent powinien przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego: choroba serca (np. zespół długiego odstępu QT), wysokie ciśnienie krwi, dławica piersiowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas wysiłku) lub inna choroba układu krążenia, cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi), jaskra z zamkniętym kątem (zwiększone ciśnienie w oczach), rozrost prostaty, nadczynność tarczycy.
- Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.