

Xylorin Protect 550 µg/ ml, aerozol do nosa, 7,5 ml



Cena: 20,65 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	7,5 ml
Postać	aerozol do nosa, roztwór
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Wiek	od 10 roku życia

Opis produktu

Opis

Xylorin Protect jest lekiem zawierającym w swoim składzie substancję czynną oksymetazolini chlorowodorek o działaniu obkurczającym na błony śluzowe, oraz deksopantenol, który nawilża błonę śluzową nosa. Dzięki połączeniu tych dwóch substancji podczas stosowania zmniejszona zostaje ilość wydzieliny z nosa, a jednocześnie pozostawia nawilżoną śluzówkę.

Wskazania

Lek Xylorin Protect stosuje się w krótkotrwałym leczeniu niedrożności nosa spowodowanej przeziębieniem u dorosłych i u dzieci w wieku od 10 lat.

Działanie

Lek Xylorin Protect charakteryzuje się szybkim działaniem zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej nosa, co zmniejsza niedrożność nosa i ułatwia oddychanie. Działanie występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się do 12 godzin.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 10 lat: 2 rozpylenia do każdego nozdrza 2 do 3 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazolini chlorowodorek. 1 ml leku Xylorin Protect, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa zawiera: 0,5 mg oksymetazolini chlorowodoru.

Pozostałe składniki: deksopantenol, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazolini chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z bardzo suchymi przewodami nosowymi (zanikowe

zapalenie błony śluzowej nosa lub suche zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): kichanie, suchość jamy ustnej i gardła.
- Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niepokój, drażliwość, miejscowe podrażnienie nosa, zaburzenia snu u dzieci.

Przechowywanie

- Przed pierwszym użyciem aerozolu, należy wypełnić pompkę. Należy trzymać butelkę pionowo i rozpylić lek 5 razy w powietrze, aż do uzyskania równomiernego aerozolu. Jeśli pompka nie była używana przez dłuższy czas, należy ją wypełnić trzema rozpyleniami w powietrze.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku Xylorin Protect nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni i nie należy przekraczać zalecanej dawki. Stosowanie leku Xylorin Protect przez długi czas może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa i zatkanie nosa.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.