

# Ziaja Aciclovir 50 mg/ g, krem, 5 g



Cena: 8,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50 mg/ g
Opakowanie	5 g
Postać	krem
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum

## Opis produktu

### Wskazania

Miejscowe leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy (tzw. zimno), wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

### Działanie

Przeciwwirusowe.

### Dawkowanie

- Stosować na skórę.
- Lek należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.
- Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.
- Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni.
- Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

### Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła lekka, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

- Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować z lekarzem w razie wystąpienia reakcji uczuleniowej, z

objawami jak na przykład obrzęk twarzy, ust czy języka, trudności w oddychaniu.

- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000): przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, swędzenie.
- Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): rumień, kontaktowe zapalenie skóry.
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): nagłe reakcje uczuleniowe, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja uczuleniowa).

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować leku na błony śluzowe, np. ust, nosa lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Nie należy dopuścić do kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.
- Nie zaleca się stosowania leku przez osoby z obniżoną odpornością. Osoby z obniżoną odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.