Apteka NAMEX

Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

# Zielnik Apteczny Krwawnik Fix, zioła do zaparzania, 30 saszetek




Cena: 7,50 zł

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Dawka | 1,8 g |
| Opakowanie | 30 saszetek |
| Postać | zioła do zaparzania w saszetkach |
| Producent | HERBAPOL-LUBLIN S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Millefolii herba |

## Opis produktu

**Wskazania**

- Przejściowy brak apetytu.
- Leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów.
- Leczenie objawowym łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji.
- Leczenie niewielkich powierzchniowych zranień skóry.

**Działanie**
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

**Dawkowanie**
Osoby starsze, dorośli i młodzież od 12. roku życia:

- przejściowy brak apetytu i leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów: 2 saszetki zalać 250 ml wrzącej wody i pozostawić na 30 minut. Pić 3-4 razy dziennie pomiędzy posiłkami świeżo przygotowany napar.
- leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji: 1 saszetkę zalać 250 ml wrzącej wody i pozostawić na 30 minut. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany napar.
- leczenie niewielkich powierzchniowych zranień skóry: 2 saszetki zalać 250 ml wrzącej wody i pozostawić na 30 minut. Stosować na skórę świeżo przygotowany napar do okładów 2-3 razy dziennie.

**Skład**
1 saszetka zawiera 1,8 g ziela krwawnika.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na ziele krwawnika lub inne rośliny z rodziny astrowatych.
- Wrzody żołądka i dwunastnicy, niedrożność dróg żółciowych i choroby pęcherzyka żółciowego.

Działania niepożądane
Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych.
- Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
- Leczenie niewielkich powierzchniowych uszkodzeń skóry Jeśli wystąpią objawy zakażenia skóry, należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia jeśli utrzymują się objawy dłużej niż: 2 tygodnie podczas stosowania leku przy przejściowym braku apetytu i w leczeniu objawowym łagodnych kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów. 1 tydzień podczas stosowania leku w leczeniu niewielkich powierzchniowych zranień skóry i w leczeniu objawowym łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.