

Zincas Forte 27 mg, 50 tabletek



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	27 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Zinci hydroaspartas
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Zincas Forte, lek w postaci tabletek. Zawiera cynk, który jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergię. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Wskazania

Niedobór cynku w organizmie.

Działanie

Uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę na dobę.
- Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.
- Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest: cynku wodorooasparaginian dwuwodny (Zinci hydroaspartas). Jedna tabletkę zawiera: 150 mg cynku wodorooasparaginianu dwuwodnego, co odpowiada 27 mg jonów cynku. Ponadto lek zawiera: sacharozę, skrobię ziemniaczaną, dekstrynę, celulozę, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian, talk.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Niewydolność nerek.

- Jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami.

Działania niepożądane

- Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy.
- Długotrwałe stosowanie leku może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.
- Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Nie należy przyjmować leku jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory). Produkty te zmniejszają wchłanianie cynku. Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.
- Lek zawiera sacharozę. Jedna tabletką zawiera 12,24 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.