

Zinkorot, 25 mg Zn²⁺, 20 tabletek



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,025 g Zn ²⁺
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	WOERWAG PHARMA GMBH & KO.KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Zinci orotas dihydricus
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Zinkorot, 25 mg Zn²⁺, lek w postaci tabletek, stosowany w niedoborze cynku w organizmie. Cynk wpływa na rozwój i fizjologię mózgu, dlatego niedobór lub nadmiar cynku powodują zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, zmiany w zachowaniu i choroby neurologiczne.

Wskazania

Niedobór cynku w organizmie.

Działanie

Uzupełnienie niedoboru cynku.

Dawkowanie

- Przyjmować doustnie z wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przyjmować bezpośrednio przed ani po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy. Nie należy przyjmować razem z posiłkami.
- Dorośli i młodzież (12-17 lat): zalecana dawka to 12,5 do 25 mg cynku (= pół - 1 tabletki) na dobę.
- Dzieci w wieku 6 do 11 lat zalecana dawka dobową wynosi 12,5 mg cynku (= pół tabletki). Lek można stosować u dzieci pod warunkiem możliwości bezpiecznego połknięcia tabletki.

Skład

Substancją czynną leku jest cynk (25 mg) w postaci cynku orotonianu dwuwodnego (157,36 mg). Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, kroskarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na orotonian cynku lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku i szukać pomocy medycznej jeśli wystąpią poniższe objawy: trudności w oddychaniu; obrzęk gardła; obrzęk ust, języka lub twarzy; wysypka lub pokrzywka.
- Bardzo rzadko: na początku leczenia, sole cynku mogą powodować bóle brzucha, nudności, niestrawność i biegunkę. Objawy te występują częściej jeśli cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego stosowania leku, lekarz zaleci badanie stężenia miedzi we krwi, ponieważ długotrwałe stosowanie cynku obniża wchłanianie miedzi. Długotrwałe stosowanie leku obniża również wchłanianie żelaza.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.
- Nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią.
- Pokarmy z dużą zawartością fityny (np. produkty zbożowe, warzywa, orzechy) zmniejszają wchłanianie cynku. Kawa może również hamować wchłanianie cynku.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Cynk może wpływać na wchłanianie miedzi. W przypadku długotrwałego przyjmowania leku Zinkorot, lekarz zaleci badanie stężenia miedzi we krwi.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.