

# Zovirax Intensive 50 mg/g, krem, 2 g

Cena: 26,99 zł



## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	2 g
Dawka	50 mg/g
Opakowanie	2 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum

## Opis produktu

### Wskazania

Miejscowe leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

### Działanie

Przeciwwirusowe.

### Dawkowanie

Stosować na skórę. Lek nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

### Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, Arlacel 165, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, dimetykon, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

- Należy przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia: reakcji alergicznej o objawach obejmujących także obrzęk twarzy.
- Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów): łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry, przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia może pojawić się bezpośrednio po nałożeniu kremu, swędzenie.
- Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): rumień, kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku Zovirax Intensive.
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.