

Zyrtec UCB 10 mg, 10 tabletek powlekanych

Cena: 13,19 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	VEDIM SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetirizinum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- w łagodzeniu objawów pokrzywki.

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę raz na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki dwa razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku Zyrtec UCB jest cetyryzyny dichlorowodorek. 1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogl 400).

Przeciwwskazania

- Ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
- Uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).

Działania niepożądane

- Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednak należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia: reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła). Reakcje te mogą wystąpić niezwłocznie po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.
- Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): senność, zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci), biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zmęczenie.
- Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): pobudzenie, parestezja (zaburzenia czucia), ból brzucha, świąd, wysypka, astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie.
- Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko), depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność, drgawki, tachykardia (przyspieszone bicie serca), nieprawidłowa czynność wątroby, pokrzywka, obrzęk, zwiększenie masy ciała.
- Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): trombocytopenia (mała liczba płytek krwi), tiki (skurcze nawykowe), omdlenie, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), drżenie, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych), obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła),

wysypka polekowa, zaburzenia oddawania moczu (moczzenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu).

- O nieznaney częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększony apetyt, próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem), utrata pamięci, zaburzenia pamięci, zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi), zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.